Test per l'osteoporosi: chi dovrebbe farlo per evitare il rischio di fratture?

La misurazione della densità minerale ossea attraverso la mineralometria ossea computerizzata non è da sola un buon metodo per predire la fragilità, soprattutto nelle persone più giovani

(Fonte: <https://www.corriere.it/> 10 agosto 2025)

Chi dovrebbe sottoporsi agli screening per l'osteoporosi e come si valuta il rischio di frattura?

Risponde **Maria Luisa Brandi**, presidente Osservatorio Fratture da Fragilità ([VAI AL FORUM](#))

La questione richiede decisioni coraggiose da parte dei sistemi sanitari. In Italia ci siamo occupati, con linee guida dedicate, del paziente che ha già subito una **frattura** da fragilità, ma **cosa facciamo per chi non si è ancora fratturato?** La domanda che spesso i pazienti pongono ai clinici è «**quando devo iniziare lo screening per l'osteoporosi?**». La risposta sembrerebbe semplice, ma non lo è. E sorprendentemente il risultato è che **l'osteoporosi risulta sotto-diagnosticata, e di conseguenza sotto-trattata, in molti Paesi sviluppati**. Per risolvere il problema dobbiamo affrontarlo sotto una luce diversa. Intanto potremmo cambiare la domanda e chiedere al medico «**quando devo iniziare lo screening per valutare la mia fragilità ossea?**».

Densità minerale ossea

La fragilità delle nostre ossa è il risultato di molti fattori, tra i quali **la misurazione della quantità del minerale presente nel nostro scheletro** che, se criticamente ridotta, determina la condizione di osteoporosi. La misurazione della densità minerale ossea attraverso **la mineralometria ossea computerizzata (MOC)** non è da sola un buon metodo per predire la fragilità, soprattutto nelle persone più giovani. Gli altri fattori sono inclusi nelle «**carte di rischio**», che determinano le probabilità di fratturarci per cause minori o spontaneamente. La prima carta di rischio sviluppata

nel mondo è la «**FRAX**», che originalmente includeva fattori indipendenti, quali **una storia familiare e personale di fratture da fragilità, età avanzata, scarsa introduzione di calcio nella dieta, consumo di alcolici, peso basso, uso prolungato di cortisonici, menopausa precoce, insufficiente contenuto di minerale nell'osso.**

Donne in post menopausa

Il rischio di frattura da fragilità potrebbe essere valutato indipendentemente dalla misurazione della densità minerale ossea e questo ci permetterebbe di **stabilire per quali pazienti serve approfondire il processo diagnostico attraverso la valutazione mineralometrica**, per aumentare l'accuratezza del calcolo delle possibilità di frattura. Altre «carte di rischio» sono state sviluppate e adattate alle realtà dei singoli Paesi. Merita di essere citata la «**DeFRACalc**», che molti medici italiani utilizzano. In un articolo pubblicato su *Jama*, **la task force del Servizio di prevenzione Usa raccomanda lo screening per l'osteoporosi alle donne in post menopausa sotto i 65 anni con aumentato rischio di fragilità ossea.** La stessa raccomandazione non può essere fatta agli uomini per mancanza di prove scientifiche.